REMORA4セット作成マニュアル

ver4.1.39.0



資料番号:R4-ST-4-1-39-0-0



◆ログイン方法 デスクトップのREMORA4のアイコン



をダブルクリック



◆終了方法
 全てのウィンドウを「×」で終了後
 タスクトレイのREMORA4アイコンを右クリック
 【終了】を選択



セット作成



◆セット作成方法

セット作成にはカルテ展開が必要です。



※階層は3階層まで作成可能です。

セットの中にセットを作ることはできません。

※次項以降のセット作成方法では、【編集】を押下し、 セット作成・修正モードになっている状態で説明をします。

セット作成方法 ~処方~



セット作成例

例) 処方

[フォルダ名科	东]処方薬剤(⁻	一般点眼)	
[フォルダ名科	尓] アトロピン	1%	
[セット名称]	両		
[診療行為]日	点アトロピン	点眼液1%	5mL
[数量] 1瓶			
[用法] 両眼	1日3回点眼	医師の指え	示通り

上記のようなセットを作る場合



フォルダ名称、セット名称を作成後 ①処方を押下します。

- ②《診療行為》に薬剤を入力します。
- ③《用法選択》を押下後マスタで作成した用法を選択します。
- ④【完了】を押下し、【編集】ボタンに表示が変わると 登録完了です。



セット	
★ 10 ▲ お気に入り 診療科 ユーザー	(4)
) 処方(ドライアイ) 処方(抗菌薬) 処方(内服) 処方(庄内薬局) セット 検査 +	 ・ ・
フォルダ追加セット追加削除につてん	: 🛛
セット追加 日点アトロピン点眼液	1% 5mL
	てから選択して下さい。
	採用 🗌 部分一致 🗌 一般名
ロ 間 覧 処方 注射 処置 検査 汎用	画 銀 1日 3回 点眼 医事の指示通り タブコード 戦約
当日 Rp. 1 院外 ↓ ② 診療行為 ③用法選択 ● 用法コント	01 両説 03 分用 03 左親 左親 右親 06 分用 西朝 ▲ □-下 クリア 57用) 1 0-現 1日の点服 © 2 0現 1日の法布 © 3 0紙 一日の点入 © 4 0 5 の眼 症状がある持 6 の親 不血時
	7 の現 彩いた時 8 の根 押い時 9 の根 ごろごろする時 マ

セット作成方法 ~注射~



□ ×

セット作成例

例)注射

[フォルダ名称]テノン嚢下注射 [セット名称]ケナコルト0.3 [手技]テノン氏嚢内注射 [診療行為]ケナコルト-A筋注用関節腔内水懸注40mg/1mL [数量]1瓶 キシロカイン点眼液4% 0.2mL ベノキシール点眼液0.4% 0.2mL クラビット点眼液1.5% 0.2mL

- フォルダ名称、セット名称を作成後 ①注射を押下します。 ②《手技》に手技料を入力します。
- ③《薬剤・材料》を入力します。

セット

④【完了】を押下して【編集】ボタンに表示が変わると 登録完了です。





セット作成例

例)処置

[フォルダ名称]処置	
[フォルダ名称]抜糸	
[セット名称]術後抜糸	
[手技]創傷処置(100cm2未満)	
[診療行為]キシロカイン点眼液4%	[数量]0.2m
ベノキシール点眼液0.4%	0.2m

上記のようなセットを作る場合

フォルダ名称、セット名称を作成後 ①処置を押下します。

- ②《手技》に手技料を入力します。
- ③《診療行為》を入力します。
- パレットからも入力が可能です。
- ④【完了】を押下し、【編集】ボタンに表示が変わると 登録完了です。





セット作成方法 ~検査~



セット作成例

例)検査

[セット名称]検査

[診療行為]スリットM(前・後眼部) スリットM(前・後眼部)後生体染色使用再検査

フローレス眼検査用試験紙0.7mg [数量]2枚 精密眼底(両)

上記のようなセットを作る場合

セット				×			
★ ■ お気に入り 共通	診療科 ユーザー		(3)	ж.			
ドライアイ)処方(抗	菌藥) 処方(内服) 処方(庄内到	锔) セット + 🔹 🕨	 <u></u> 完了 □ よく	使う			
フォルダ追加セッ	卜追加 削除						
	病久 カルテ病久 コマント	⊕追加	✔ 編集 盲 削除				
	▶ <u>○</u> <u>∨ 検索条件</u>						
	□□□ いれ (ア ジン 一覧 初再診 処方 注射	▶ ₩ [7/] 処置 <u>校</u> 査 汎用					
	当日		^ -				
		9		初再診 処方		以上 派 <u>读</u> 査 汎用	
	2 診療行為						
		=+ パレット	+ グル ス	リットм (前眼部)			
			2	リットM (前・後眼音	D)後生体染色使用再	検査	:
			フ 精	ローレス眼検査用試験 密眼底(両)	銳紙0.7mg	2枚	:
						=+ パレ	ット + グル

フォルダ名称、セット名称を作成後 ①検査を押下します。

- ②《診療行為》を入力します。
- パレットからも入力が可能です。
- ③【完了】を押下し、【編集】ボタンに表示が変わると 登録完了です。





《処方、注射、処置、検査以外の診療行為は汎用へ入力》 ※手術は汎用へ入力になります。

セット	□ ×
★ ■ 图 ▲ お気に入り 共通 診療科 ユーザー	(4) ×
義) 処方 (内服) 処方 (庄内薬局) セット 検査 病名 全セット 採血 処置 🛨 💶 🕨	完了 □ よく使う
フォルダ追加 セット追加 削除	
● 処万楽剤(- ● 追加 ● 追加	・編集 盲 削除
▶ 検査 検査 検査	
→ 白内庫 → △ ◆ 検索条件	
□□ \$.# ⑦ 於 ঊ Ⅲ № 一號 初再診 処方 注射 処置 按重 <u>汎用</u>	
当日	
実 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	: 🕂 🔳
2 診療行為	: 🛛
3 診療行為区分	-
	+ グループ

医学管理	在宅料	処方料
皮下筋肉注射	静脈注射	点滴注射
その他注射	処置行為	手術
輸血	ギプス	麻酔
検査	画像診断	その他
処方箋料	精神科專門療法	保険外(消費税なし)
保険外(消費税あり)	コメント(処方箋備考)	コメント
コメント(医事送信対象外)		

- フォルダ名称、セット名称を作成後 ①汎用を押下します。 ②《診療行為》を入力します。 ③《診療行為区分》を選択します。
- ④【完了】を押下し、【編集】ボタンに表示が変わると登録完了です。

÷ 🖬		
お気に入り 共通 👔	■ ▲ ◎療科 _ ユーザー	٩
§) 処方(内服) 処フ	方 (庄内薬局) セット 検査 病名 全セット 採血 処置 手 ◀ ▶	編集 🗌 よく使う
▶ 処方薬剤(当日	
✓ 使且 検査	手前 手術 白内障	実承
→白内障	水晶体再建術(眼内レンズを挿入す…	
	(後)オフミック点眼液 1 m L	
	(後)オフロキシン眼軟育0.3% 3.5g	
	キシロカイン点眼液4% 2mL	
	ベノキシール点眼液 0.4% 2 m L	
	ビーエスエスプラス500眼灌流… 1 瓶	
	ボスミン注1mg 0.1%1mL 1管	
	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%… 1筒	

セット作成方法 ~病名~



《病名をセットに登録する方法》





①登録したいセットを選択します。
 ②【追加】を押下後、病名画面にて病名を入力します。

- ③【OK】押下時、セットに反映します。
- ④【完了】を押下し、編集ボタンに表示が変わると登録完了です。
- ※コードがある病名に関しては自動でコード化されます。
- コードがない病名は【OK】を押下時、編集病名で登録されます。

セット作成方法 ~記事~



《記事をセットに登録する方法》



セット作成方法 ~当日オーダ-~



《当日オーダー画面よりセットに登録する方法》



①登録したいセットを選択します。

②当日オーダーの画面よりセットに入れたいオーダーをドラッグ&ドロップします。③【完了】を押下し、【編集】ボタンに表示が変わると登録完了です。

セット ~お気に入り~



《お気に入りの登録方法》

フォルダまたはセット右クリックすると、メニューが表示されます。 メニュー内の"お気に入り"を選択することで、登録できます。



①ボタン表示の場合、セットはワンクリックでカルテに反映します。
 (設定にて【リスト表示】もしくは【ボタン表示】(上画面)の表示形式を選択できます。
 【リスト表示】は診療科セット・ユーザセットと同じ表示形式です。
 ②フォルダはボタンに▼が表示します。
 ボタンをクリックするとフォルダに登録した階層がメニュー表示します。
 ③名称・色変更:ボタンの名称及び色の変更ができます。
 お気に入りから解除します。
 ジャンプ:登録元のセット画面に切り替わります。

セット ~よく使う~



《よく使うの登録方法》

編集状態にし、セットを右クリックすると、メニューが表示されます。 メニュー内の"よく使う"を選択することで、セット名の前に青色のマークが表示します。





"よく使う"にチェックを入れることで、登録したセットのみ表示することが可能です。

セット ~ファンクションキーへの割当て~



《セットをファンクションキーへ割当てる方法》



14



キーを割当てたセットを選択して、再度「ファンクションキー割当て」をク リックすると、割当てキーは緑枠で囲まれています。 緑枠内をクリックすると、キーの割当ては解除されます。

	-	Ctrl	Shift	
F1	(ア) ログ	(ア) 設定	(未使用)	
F2	(未使用)	(未使用)	(セ) 全診区+看護・持参薬	
F3	(未使用)	(未使用)	(木伊用)	
(※)「設定>ファンクションキー」と、本機能は連動しています。すでに 「設定」で割り当てられているキーを使用した場合は「設定」も変わります ので注意をしてください。				

(※) Windows標準のファンクションキーの動作の影響もあるため、 設定時には問題がないか動作を確かめながら設定してください。 セット ~オーダーをテキストとしてコピー~



《セットのオーダーをテキストとしてコピー方法》







セット ~セット検索~







